

Teeltechnische informatie					
Volle grond	Zaaitijd	Planttijd	Plantafstanden	Benodigd aantal pillen per 10m2	Bijzonderheden

Andijvie					
- vroeg	maart	maart-april	30 x 30	100	opkweek bij 20-22 C
- zomer	h. april - h. juni	h. mei - h. juli	30 x 30	100	opkweek onder glas
- herfst	h. juni - h. juli	h. juli - h. aug.	40 x 30	75	opkweek onder glas
- herfst laat	eind juli	half aug.	40 x 30	75	opkweek onder glas of vollegrond

Kropsla					
- zeer vroeg	eind febr.	20 maart - 10 april	30 x 30	100	opkweek onder glas in 4cm perspot
- vroeg	h. maart - 20 april	10 april - 20 mei	30 x 30	100	opkweek onder glas in 4cm perspot
- zomer	20 april - 5 juli	20 mei - 25 juli	30 x 30	100	opkweek onder glas in 4cm perspot
- herfst	5 juli - 15 aug.	25 juli - 5 sept.	30 x 30	100	opkweek onder glas in 4cm perspot

Witlof					
- vroeg	begin mei		40 x 12	200	vlakvelds of ruggenteelt
- middenvroeg	half mei		40 x 12	200	vlakvelds of ruggenteelt
- middenlaat	eind mei		40 x 12	200	vlakvelds of ruggenteelt

Wortelen					
- bospeen	h. febr. - e. juli		25 x 1 of 10 x 25	4000	vroege bospeen of tijdelijk onder folie
- waspeen	maart - mei		25 x 0,5 of 15 x 1	6000	met Nantes minder zaadverbruik
- winterpeen	maart - mei		35 x 0,5	600	

Pillenzaad, hoe en wat?

Het zijn kleine bolletjes (pillen) die bestaan uit het zaad voorzien van een omhulsel van klei, eventueel voorzien van voedingsstoffen en/of bestrijdingsmiddelen.

Bij de gewassen andijvie, kropsla, prei en wortelen was het tot nu toe gebruikelijk om na de opkomst van het gewas te dunnen of te verspenen. Dit moest gebeuren om een goede, gezonde en stevige plant te krijgen. Dunt of verspeent men de kiemplantjes niet, dan krijgt men lange, slappe plantjes, die bovendien vatbaarder zijn voor ziektes en plagen. Hiervoor zijn gepilleerde zaden ontwikkeld, de zogenaamde zaadpil.

De professionele tuinders maken hier gebruik van. Het gebruik van pillenzaad is ook voor de hobbytuinder interessant, omdat men niet meer hoeft te dunnen of te verspenen. Een ander voordeel van het gebruik van pillenzaad is de zichtbaarheid. Door de lichtbeige omhulling is het reeds gezaaide zaad ten alle tijden uitstekend zichtbaar en heeft men dus een goed overzicht op de voortgang van het zaaierk.

Andijvie, prei en kropsla worden onder glas in perspotjes gezaaid, terwijl wortelen direct ter plaatse in de vollegrond op eindafstand worden gezaaid.

Voor een goed resultaat adviseren wij het volgende:

Zaai niet dieper dan 1 cm en zorg voor een rulle, vochtige grond. Druk de zaden lichtjes aan en dek ze af met een dun laagje aarde. Een goede vochtvoorziening is noodzakelijk om tot een vlotte kieming te komen. Maar pas op voor het dichtslaan van de grond, d.m.v. grote hoeveelheden regen in één keer.

